


Patients on GLP-1 medications*

STOP ALL Solid Foods at 5PM

When: 5PM the night before your procedure.

What to avoid: All solid foods, including snacks, gum, and candy.



CLEAR LIQUIDS ONLY

Allowed from 5PM the day prior until 2 hours before your arrival time. Clear liquids include:

Water

Black tea & coffee (NO MILK/CREAM)

Fruit juice without pulp (like apple juice)

Gatorade or similar clear sports drinks



Stop drinking all clear liquids exactly 2 hours before your scheduled arrival time!

Important – Failure to follow these instructions can lead to the cancellation of your procedure!

Pacientes que toman medicamentos GLP-1*

PARAR DE CONSUMIR TODOS LOS ALIMENTOS SÓLIDOS A LAS 5PM



Cuándo: A las 5PM, la noche anterior a su procedimiento. **Qué evitar:** Todos los alimentos sólidos, incluyendo aperitivos, chicles y caramelos.



SOLO LÍQUIDOS CLAROS

Permitido desde las 17:00 del día anterior hasta 2 horas antes de la hora de llegada.

Los líquidos claros incluyen:

Agua

Té y Café negro (SIN LECHE NI CREMA)

Jugo de frutas sin pulpa (por ejemplo, jugo de manzana)

Gatorade o bebidas deportivas claras similares



Deje de beber todos los líquidos claros exactamente 2 horas antes de la hora programada de llegada.

Importante: No seguir estas instrucciones puede llevar a la cancelación de su procedimiento.



***IMPORTANT!**

Patients using WEEKLY Injectible
GLP-1 Agonist Medications, such as:

- Semaglutide (Ozempic, Wegovy)
- Tirzepatide (Mounjaro, Zepbound)
 - Exanatide ER (Bydureon)
 - Albiglutide (Tanzeum)
 - Dulaglutide (Trulicity)

Instructed to **STOP** their last dose

At least **One full week**

Prior to the day of surgery &

STOP solid foods by 5 PM the NIGHT BEFORE!

Patients on DAILY Injectible GLP-1
Agonist Medications, such as:

- Exenatide (Byetta)
- Liraglutide (Victoza, Saxenda)
- Lixisenatide (Adlyxin)

Instructed to **STOP** taking the day of surgery &

STOP solid foods by 5PM the NIGHT BEFORE!





*¡IMPORTANTE!

Pacientes que usan medicamentos agonistas de GLP-1
inyectables semanalmente, como:

- Semaglutida (Ozempic, Wegovy)
- Tirzepatida (Mounjaro, Zepbound)
 - Exanatida ER (Bydureon)
 - Albiglutida (Tanzeum)
 - Dulaglutida (Trulicity)

Instrucciones para **PARAR** la última dosis

Al menos **una semana completa**

antes del día de la cirugía y

**DEJAR de comer sólidos antes de las 5 PM la NOCHE
ANTERIOR!**

Pacientes con medicamentos agonistas de GLP-1
inyectables diariamente, como:

- Exenatida (Byetta)
- Liraglutida (Victoza, Saxenda)
 - Lixisenatida (Adlyxin)

Instrucciones para **DEJAR** de tomar el día de la cirugía y

**DEJAR de comer sólidos antes de las 5 PM la NOCHE
ANTERIOR!**

